



Rua Ramos Ferreira nº 1280. Centro.FONE:3633-4977

PREPARO PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL

USO INTERNO

LAXOL (ÓLEO DE RÍCINO).....1 FRASCO.

TOME O CONTEÚDO DE TRÊS COLHERES DAS DE SOPA PELA VIA ORAL

NA MANHÃ DA VÉSPERA DO EXAME.OBSERVAR DIETA LÍQUIDA SEM RESÍDUOS.

USO INTERNO

DRAMIN B6 (DIMENIDRINATO 50 mg, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10mg)

TOME UM COMPRIMIDO PELA VIA ORAL UMA HORA ANTES DE INICIAR A INGERIR O MANITOL, CONFORME ABAIXO.

USO INTERNO

MANITOL 20% (FRASCO DE 250 ml)..4 FRASCOS.

DILUIR O CONTEÚDO DOS 4 FRASCOS EM 1 LITRO DE CHÁ A GOSTO E TOMAR VIA ORAL O CONTEÚDO DE UM COPO (240 ml) A CADA 15 MINUTOS (A SOLUÇÃO DEVE SER TOMADA POR INTEIRO NO ESPAÇO DE DUAS HORAS). TOMAR ÁGUA MINERAL Á VONTADE NOS INTERVALOS.

INICIAR ÀS 23:00H DA VÉSPERA DO EXAME. OBSERVAR JEJUM ALIMENTAR.

NO DIA DO EXAME PELA MANHÃ AS 6:00h

EFETUAR FLEET ENEMA 6:00h.